Évolution de la perception visuelle après un accident vasculaire cérébral

Audrée-Jeanne Beaudoin, Bénédicte Fournier, Léonie Julien-Caron, Lucie Moleski, Joanie Simard, Louisette Mercier et Johanne Desrosiers

ABRÉGÉ

Introduction : Les troubles visuoperceptifs sont fréquents après un accident vasculaire cérébral (AVC) et conduisent souvent à une réduction de l'autonomie fonctionnelle. Mieux comprendre l'évolution de ces troubles devrait permettre de cerner les besoins d'interventions ergothérapiques. **Objectif:** Documenter l'évolution des atteintes visuoperceptives suivant un AVC chez les ainés de 65 ans et plus. **Méthodes :** Cette étude a été réalisée auprès de 195 participants recrutés dans un de ces milieux de soins : 1) hôpital de courte durée (groupe HCD), 2) unité de réadaptation fonctionnelle ou hôpital de jour (groupe RÉA). La perception visuelle a été mesurée avec le Motor free Visual Perceptual Test- version verticale (MVPT-V). Tous les participants ont été évalués au début de l'étude (T1). Seuls ceux présentant des déficits étaient évalués trois mois (T2; n = 99) ou six mois (T3; n = 67) plus tard. **Résultats :** Les scores moyens au MVPT-V sont similaires pour les deux groupes. Malgré une amélioration des scores dans le temps ($p < 0,05$), les profils d'évolution sont très variés entre les participants. En effet, environ 50 % des participants des deux groupes se sont améliorés alors que 42 % du groupe HCD et 23 % du groupe RÉA se sont détériorés. Conclusion : Les données supportent que les troubles visuoperceptifs évoluent différemment suivant l'AVC. Malgré des troubles comparables dans les deux groupes, les participants du groupe HCD n'ont pas été dirigés vers des services de réadaptation alors qu'un plus grand pourcentage d'entre eux s'est détérioré.