Étude exploratoire: Perception de la domotique chez les personnes ayant eu un accident vasculaire cérébral et leur aidant.

Claudine Bastille, étudiante erg, Evelyne Beauregard, étudiante erg, Carolane Giguère, étudiante erg, Kathleen Morin-L., étudiante erg, Erika Tétreault, étudiante erg. Nathalie Bier, PhD, erg ;

Résumé

Objectifs : Explorer la perception de la domotique chez la clientèle AVC et leur proche aidant et explorer l'impact des caractéristiques sociodémographiques sur cette perception.

Participants: Les participants sont trente-et-une (31) personnes ayant subi un AVC répondant aux critères suivant : avoir des troubles physiques et/ou cognitifs, vivre à domicile, résider en Estrie, parler la langue française, ne pas résider en milieu de soins de longue durée et ne pas avoir de troubles cognitifs importants. Seize (16) aidants ont également participé.

Instrument de mesure : Un questionnaire sur la perception de la domotique administré sous-forme d'entrevue comportant des questions sur plusieurs types de technologies.

Résultats : La majorité des personnes ayant subi un AVC ainsi que la plupart des aidants ont une perception « un peu favorable » de la domotique. La technologie jugée la plus utile par les aidés (33,3%) et par les aidants (18,8%) est un capteur de données de santé à distance. La technologie jugée la plus menaçante par les aidants à 35,7% est celle permettant d'être suivi sur un écran. Aucune corrélation significative n'est présente entre les caractéristiques sociodémographiques et la perception de la domotique.

Conclusions : Les résultats sur la perception de la domotique sont similaires à ceux d'études auprès de la clientèle aînée, soit qu'une attitude favorable est présente envers la technologie. Les caractéristiques sociodémographiques n'influencent pas la perception de la domotique. Cela contraste avec les résultats d'autres études auprès des personnes âgées pour qui certains facteurs personnels influençaient l'attitude par rapport à la domotique.

Mots clés : Domotique, AVC, perception, proche-aidant, technologie.

Validation du Profil du Loisir chez une population ayant subi un AVC

Côté G.[1], Girouard V. [1], Ménard M. [1], Ouellet J. [1], Parent A.[1], Proteau P. [1], Desrosiers J. erg, PhD[1] et Bier N. erg, PhD[2]

Résumé

Contexte. L'accident vasculaire cérébral (AVC) a un impact néfaste sur la réalisation des habitudes de vie et rend difficile la reprise des activités exercées avant l'accident, tel que le loisir. Il a été prouvé que le loisir a plusieurs effets bénéfiques au point de vue psychologique et physique chez la personne. Toutefois, en réadaptation, peu d'outils permettent de bien cerner le portrait de la personne en ce qui concerne le loisir. Le *Profil du Loisir* est un outil qui évalue la participation dans les loisirs. Il n'est actuellement validé que pour une clientèle ayant subi un traumatisme crânio-encéphalique. **But**. L'étude vise à valider le *Profil du Loisir* par validité concomitante chez une population ayant subi un AVC, puis à étudier les facteurs influençant la pratique de loisir chez cette même population. **Méthodologie**. Trente participants ayant subi un AVC ont répondu à quatre questionnaires portant sur l'autonomie fonctionnelle (SMAF), les aptitudes intellectuelles (MMSE) et les loisirs (*Profil du Loisir* et *Profil Individuel en Loisir*) lors d'une ou deux rencontres. Le *Profil du Loisir* a ensuite été corrélé avec le *Profil Individuel en Loisir* afin de vérifier sa validité concomitante. Pour ce qui est des facteurs, la fréquence de pratique du loisir, tirée du Profil du loisir, a été mis en relation avec diverses variables (SMAF, MMSE, âge, *etc.)*. **Résultats.** Un lien effectif modéré (rs : 0,41; p<0,01) a été observé entre le résultat total du *Profil du Loisir* et celui du *Profil Individuel en Loisir*. Les sections « Fréquence de pratique avant et après l'AVC » et « Degré d'intérêt après l'AVC » du *Profil du Loisir* sont fortement corrélées avec les sections similaires du *Profil Individuel en Loisir* (rs : 0.77 à 0.80; p<0.01). Les autres sections de l'outil n'ont pas montré de corrélation significative. Le résultat total du SMAF apparaît comme la variable la plus prédictive de la fréquence de pratique du loisir après l'AVC (r^2 : 0,37) lorsque comparée aux autres variables étudiées. **Conséquences pour la pratique.** Le Profil du Loisir a le potentiel d'offrir aux ergothérapeutes cliniciens un outil valide pour l'évaluation de la participation dans les loisirs chez une population ayant subi un AVC.