TROUBLES VISUO-PERCEPTIFS PERSISTANTS POST-AVC : FACTEURS ASSOCIÉS.

Prince, M., Beauchemin, J., Casavant, S., Jolicoeur, D., Lamontagne V., Mercier, L. et Desrosiers, J.

Introduction : L'accident vasculaire cérébral (AVC) peut être la cause de troubles visuo-perceptifs qui affectent plusieurs sphères occupationnelles des personnes atteintes. Chez plusieurs d'entre elles, ces problèmes peuvent perdurer à la suite de l'AVC.

Objectif : Identifier, parmi un ensemble de variables, lesquelles peuvent le mieux expliquer la persistance des troubles visuo-perceptifs de personnes âgées ayant subi un AVC.

Méthodes : La perception visuelle de 195 personnes âgées de 65 ans et plus et ayant subi un AVC a été évaluée à l'aide du Motor free Visual Perceptuel Test, version verticale (MVPT-V) trois semaines suivant le retour à domicile (T1). Seules les personnes ayant un score inférieur aux normes selon l'âge et la scolarité étaient ré-évaluées trois mois (T2 : n = 99) et six mois (T3 : n = 70) plus tard. Diverses variables personnelles et biopsychosociales ont aussi été évaluées au T1. Des analyses de corrélation bi-variées suivies d'analyses de régression linéaire multiple ont été réalisées.

Résultats : De nombreuses variables sont associées à la perception visuelle. Toutefois, les variables mesurées au T1 qui expliquent le mieux la persistance des troubles visuo-perceptifs à T3 (R^2=52,6%) sont la participation dans les activités courantes (*MHAVIE)* (p<0,001). la compréhension verbale (*Token Test)* (p=0,03), la scolarité (p=0,05), la mémoire (test de *Wechsler)* (p=0,05).

Conclusion : Les liens significatifs entre la participation dans les activités courantes des ainés ayant subi un AVC et les troubles persistants de la perception visuelle suggèrent l'importance d'adapter, et ensuite d'évaluer, les interventions ergothérapiques auprès de cette clientèle.